

269 Mochuelo común



Mochuelo común. Adulto (04-VII).

MOCHUELO COMÚN (*Athene noctua*)

IDENTIFICACIÓN

21-27 cm. Dorso pardo, con machas redondeas blancas; pecho franjeado difusamente de pardo y blanco; plumas de vuelo pardas, manchadas de blanco y ocre; cola parda con fino barrado ocre claro; cabeza rechoncha y achata-da, sin “orejas”; pico verde-amarillento; ceja blancuzca y ojos amarillos.

ESPECIES SIMILARES

El **autillo** tiene un tamaño similar (un poco menor) y ojos amarillos, pero presenta “orejas” en la cabeza, que es más fina, y tiene el pecho y el dorso finamente vermiculados.



Autillo

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar; las **hembras** son mayores que los **machos** y los ejemplares extremos pueden sexarse: **machos** con envergadura menor de 543 mm. y peso menor de 140 gr.; **hembras** con envergadura mayor de 580 mm. y peso mayor de 180 gr.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con la cabeza y el dorso marrón, sin o con pocas marcas blancas; plumas del capirote con estrecho borde marrón; plumas del ala nuevas; la punta de la 10ª primaria es puntiaguda.

1º año otoño/2º año primavera con apariencia similar a la de los adultos, pero se reconocen por cambiar algunas grandes coberteras externas (de color gris oscuro y con una mancha grande de color blanco), que contrastan con las grandes coberteras no mudadas (de color marrón y con una macha pequeña de color crema) y con las coberteras primarias; las secundarias son afiladas y con el borde desflechado; la punta de la 10ª primaria es puntiaguda.

Adultos con las plumas del ala de la misma generación; la punta de la 10ª primaria es redondeada; las secundarias son redondeadas y con borde de contorno definido.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada entre septiembre y noviembre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y, al menos, las grandes coberteras más externas; suele terminar a finales de octubre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria ligada a zonas abiertas con árboles, edificios o cortados; ampliamente distribuido por toda la Comunidad faltando sólo en el tercio norte.



Mochuelo común. Diseño de las patas.

269 Mochuelo común



Mochuelo común. Juvenil (02-VII).



Mochuelo común. Diseño de las plumas del capirote: arriba izquierda adulto (04-VII); arriba derecha 1º año (18-IX); izquierda juvenil (02-VII).



Mochuelo común. Diseño de la cabeza: izquierda adulto (04-VII); derecha juvenil (02-VII).



Mochuelo común. Diseño del dorso: izquierda adulto (04-VII); derecha juvenil (02-VII).



Mochuelo común. Diseño del pecho: arriba adulto (04-VII); abajo juvenil (02-VII).



Mochuelo común. Diseño de la cola: izquierda adulto (04-VII); derecha juvenil (02-VII).

269 Mochuelo común



10^a



10^a



10^a

Mochuelo común. Diseño de la punta de la 10^a primaria: arriba izquierda adulto (04-VII); arriba derecha 1^o año (19-IX); izquierda juvenil (02-VII).



Mochuelo común. Muda postjuvenil. Ala de 1^o año (19-IX)



Mochuelo común. Diseño de la punta de secundarias: arriba izquierda adulto (04-VII); arriba derecha 1^o año (19-IX); izquierda juvenil (02-VII).



Mochuelo común. Muda postnupcial. Ala de adulto (18-II).



Mochuelo común. Ala de juvenil (02-VII)